

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 12-8-77137881

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone 92-42-68 - Postes 440 et 449

ABONNEMENT ANNUEL :

50,00 F

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux
Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 87 du 5 AOÛT 1977.-

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE.- (Poiriers - Pommiers)

Le second vol du carpocapse est en cours et des attaques pourront se produire prochainement.

Il est conseillé d'effectuer un traitement à la fin de la semaine du 8 au 14 Août.

S'il y a lieu, intervenir en même temps contre les acarions et la tavelure (des attaques sérieuses sont parfois constatées tant sur feuilles que sur fruits).

VIGNE

TORDEUSES DE LA GRAPPE.-

Le second vol de *Cochylis* et d'*Eudomis* est en cours.

Dans les clos habituellement exposés à des attaques importantes prévoir un traitement entre le 10 et le 12 Août.

MILDIOU.-

Dans les parcelles où l'on observe des foyers avec des attaques sur grappes, il est conseillé de renouveler la protection avant le 12 Août.

Intervenir en même temps contre l'*Oïdium*.

Clermont-Ferrand, le 5 Août 1977.

L'Ingénieur d'Agronomie

Adjoint au Chef de Circonscription;

A. FARGEIX.

Directeur-Gérant : P. JOURNET.

N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD.

P466

TRAITEMENT DES SOLS AU BROMURE DE METHYLE

RECOMMANDATIONS AUX PERSONNES, ENTREPRISES ET GROUPEMENTS
AGREES ET AUX UTILISATEURS

La limitation des résidus bromés devient de plus en plus nécessaire pour les cultures légumières mises en place sur un sol désinfecté.

Un document général envoyé aux conseillers horticoles intéressés et intitulé "La désinfection des sols au bromure de méthyle - Limitation des résidus bromés dans les légumes" fait une large part aux moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ce but.

Ces mesures techniquement nécessaires se situent aux trois stades suivants :

- Au niveau de la préparation du terrain pour le traitement :

La température, l'humidité relative, la porosité, les matières organiques et les amendements calcaires.

- Au niveau du traitement proprement dit :

La dose, la durée de contact, la fréquence du traitement.

- Au niveau de la préparation du terrain pour la remise en culture :

L'aération, le "lessivage".

Il convient de travailler en collaboration avec les Agriculteurs et de les aider :

- par des conseils ;
 - par la mise en application des mesures appropriées, détaillées dans le document ci-dessus indiqué.
-